



# Probabilidad: Leyes de De Morgan


## Leyes de De Morgan

Matemático, filósofo y abogado que nació en las colonias británicas de la India, a finales del siglo XVIII. A los 16 años ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde aprendió de Peacock y Whewell, primero profesores y después amigos, Álgebra y Lógica, dos ramas de las Matemáticas en las que se hizo especialista.

En Probabilidad se le conoce por sus leyes, que pueden demostrarse fácilmente con teoría de conjuntos:


I) “La negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones”  $A \bar{\cap} B = \bar{A} \cup \bar{B}$

Matemáticamente: “El contrario de la intersección es la unión de los contrarios”



II) “La negación de la disyunción, es la conjunción de las negaciones”  $A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}$

Matemáticamente: “El contrario de la unión es la intersección de los contrarios”



Para evaluar la independencia de sucesos, debe tenerse en cuenta que:

Si  $p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) \Rightarrow$

A y B independientes, es decir, el resultado de uno, no influye en la probabilidad del otro.

Si  $p(A \cap B) \neq p(A) \cdot p(B) \Rightarrow$

A y B dependientes. La probabilidad del segundo, se ve afectada por el resultado que haya salido en el otro.

Para evaluar esta situación, debe calcularse la probabilidad de la intersección,  $p(A \cap B)$ , de dos formas:

1ª) A través de igualdades que se verifican siempre para todo tipo de sucesos, como son:

Tercer axioma de Kolmogorov:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

Leyes de De Morgan:


$$p(A \bar{\cap} B) = p(\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$p(A \bar{\cup} B) = p(\bar{A} \cap \bar{B})$$

Otras identidades lógicas:

Se comprueban con diagramas de conjuntos, y no es necesario aprenderlas de memoria.

Ej:  $p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(B) - p(A \cap B)$



Para entender el diagrama, hay que sombread de un un color el contrario de A (todo lo que no pertenezca a la bola A), y de otro a la bola B. La intersección entre ambos, es lo que está de ambos colores a la vez. En este ejemplo, es fácil ver que constituye la bola B completa, excepto el pequeño fragmento de su intersección con A.

2ª) Calcular el producto  $p(A) \cdot p(B)$  Si coincide con  $p(A \cap B)$  calculada anteriormente, los sucesos son independientes.

Ejercicios:

1) Si se cumple que 
$$\left\{ \begin{array}{l} p(A)=0,6 \\ p(B)=0,9 \\ p(A \bar{\cup} B)=0,46 \end{array} \right\}$$

a) ¿Son A y B independientes?

b) ¿Son  $\bar{A}$  y B independientes?

